

Photinia (glansmispel)



Algemeen

De glansmispel (*Photinia*) komt van nature voor in Zuidoost-Azië en de Himalaya. Van de meer dan 60 soorten worden hier vooral de soorten *Photinia x fraseri* (zoals de cultivar 'Red Robin', zowel als struik als op stam) en *Photinia villosa* var. *laevis* aangeboden. *Photinia x fraseri* wordt circa 2,50 m hoog en 2,00 m breed. In mei bloeit hij met tuilen witte bloempjes. De struik is wintergroen en heeft groot glanzend groen blad, dat opvallend rood uitloopt in het voorjaar. *Photinia villosa* wordt hoger, 3 tot 4 m en circa 3 m breed. Deze struik is bladverliezend. Hij bloeit weinig opvallend crèmewit in mei. In het voorjaar lopen ze roze tot bronsgroen uit, en in het najaar krijgen ze een mooie orangerode herfstkleur en rode bessen. Door het rood uitlopen van het blad beschermt de plant zich tegen zonnebrand, waar ze in de natuurlijke omgeving, die vaak nog lang besneeuwd is, anders last van zouden kunnen hebben.



Verzorging

Zowel *P. x fraseri* als *P. villosa* groeien op alle soorten humusrijke grond. De grond moet goed doorlatend zijn, en aan de vochtige kant. Ze hebben graag een standplaats in de zon of in de halfschaduw, die wel wat beschut moet zijn. Staan ze vol op de wind of anderszins onbeschermd dan kunnen de struiken in strenge winters flink invriezen.

Photinia x fraseri als solitaire heester hoeft eigenlijk nauwelijks gesnoeid te worden. Vroeg in het voorjaar kan eventueel dood, beschadigd of kruisend hout weggeknipt worden. Ook uitschietende takken kunnen

dan ingekort worden. Wordt hij te groot of moet hij verjongd worden, dan kan hij wel flink teruggeknipt worden: hij loopt over het algemeen weer goed uit op het oude hout.

Photinia villosa var. *laevis* wordt beter al in de winter gesnoeid, als hij zijn blad verloren heeft. Ook kan hij dan als dat nodig is uitgedund worden. Ook deze struik kan dan tot op het oude hout teruggeknipt worden.

Beide soorten kunnen ook als haag aangeplant worden. Daarbij kan de hoofdscheut doorgroeien tot de gewenste hoogte. De zijscheuten worden dan als haag geknipt, en telkens wat ingekort. In principe is eenmaal knippen in augustus voor de wintergroene *P. x fraseri* voldoende. Is de haag al eerder te rommelig dan kan ook eind mei of in juni al een keer geknipt worden. *P. villosa* wordt al in maart of april voor de eerste keer geknipt, en daarna tussen april en september ongeveer om de 6 weken (enigszins afhankelijk van de standplaats en de weersomstandigheden).

Bemesten kan in het voorjaar met wat compost. Dit houdt zowel de voedingstoestand als het humeuze gehalte van de grond op peil. Aanbrengen van een mulchlaag kan natuurlijk ook. Hiermee wordt ook de verdamping van vocht uit de grond verminderd.

Ziekten en plagen

De glansmispel heeft weinig last van ziekten of plagen. Alleen *Photinia davidiana* is gevoelig voor bacterievuur.

